7 4

La Rochelle

Vass3R06s381-385

FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp624

La Rochelle 3R6 1881-385

FH









N° d'ordre : La Rochelle Désignation : La Rochelle Emplacement : 3 R 6 1381-385.

THE BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moven 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séleux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189)

cotommeux 190 - sans villosité pubescenta 278 - sans villosité

laineuse 279.

Blanc (19) - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liméré carminé (194) -

plance 19) - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liméré carminé (194) - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entiègement bronzé ou cuivré 197 vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées y en gouttière - mutres.

race inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotomeuses 204 - sans villosité pubescente 280 sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou outurées 210 - entièrement bronzées ou outurées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas on la première feuille détachée est à lisété carmins, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées mere notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieur

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (8) - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe blan - en gouttière - involuté - révoluté - tourments.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287

Totaloment - #111on - partiellement.

N° d'ordre : La Rochelle Désignation : La Rochelle

Emplacement: 3 R 6 J 384 385.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral: gros - moyen - petit.

Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

2/02

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1999

Code introduction:

Observateur: TL

Code cépage : Nom introduction : La

1: La Rochelle

Emplacement: 3 RG 1381_385

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5) grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3- vert moyen 5- vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1)- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmente 5 / 6 / 6

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1- présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 présente 9.

oiv 075 cloqûre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre): nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1) présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5) plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2{3}4-5-6 / forme = U-accol. (V) dent = outpnon / dégarni = non-parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3-moyen (31-50%) 5- élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

hair catalon

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1/- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2) coloré 1.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1398

Code clone:

Code cépage : Nom cépage: La Rochelle Observateur: Lacombe

Emplacement: 3 RG & 381-385 OF

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm)(7)- très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7) très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5)- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement/1)- moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2)- deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9) 37

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-25 26mm) (7) très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3.

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir (6.)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse D- très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent (1) apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée/1)- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse (1) juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7) très élevée 9

oiv 236 saveur : aucune 1- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7) très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3)

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) présentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Annec 1998

Code cépage

Code clone

Nom cépage La Rochelle

Observateur TL

Emplacement: 3 R6 & 381_ 385

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire ①- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2) rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ①- présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence ① présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: (très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 oiv 354 diamètre entrenoeuds: (très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve / très élevé 9

Vassal

Noends: aplatis 1 - moyens(2)- saillants 3

viqueur: 3